

建曲

Jianqu

本品为辣蓼、藿香、青蒿等二十一味中药细粉与麸皮、面粉混合后，经发酵而成的曲块的炮制加工品。

【炮制】 取药材，碎成小块或颗粒。

【性状】 本品呈不规则小块或颗粒。表面黄棕色至黄褐色，粗糙。断面疏松，黄褐色。气清香，味微苦。

【鉴别】 本品粉末黄棕色。稃片外表皮表面观长细胞与短细胞（栓化细胞和硅质细胞）交互排列，长细胞壁厚，紧密深波状弯曲，短细胞类圆形，有稀疏壁孔（麦芽）。石细胞单个散在或成群，无色或淡黄色，类多角形、长圆形或不规则形，孔沟及层纹明显，有的胞腔内含深棕色物，直径 $19\sim 125\mu\text{m}$ （山楂）。种皮表皮细胞为栅状，有纵沟纹，光辉带明显；表面观多角形，胞腔极小，孔沟细密；底面观细胞呈多角形，壁稍厚，胞腔大，内含红棕色至红色物质（赤小豆）。内胚乳细胞多破碎，无色，具较多大型纹孔，类圆形或椭圆形（槟榔）。分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物（香附）。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维（甘草）。

【检查】 水分 不得过 10.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 2.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

黄曲霉毒素 照真菌毒素测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2351）测定。

本品每 1000g 含黄曲霉毒素 B₁ 不得过 5 μg ，黄曲霉毒素 G₂、黄曲霉毒素 G₁、黄曲霉毒素 B₂ 和黄曲霉毒素 B₁ 总量不得过 10 μg 。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的冷浸法测定，不得少于 20.0%。

【性味与归经】 辛、甘，温。归脾、胃经。

【功能与主治】 消食化积，健脾和胃。用于寒热头痛，宿食积滞，胸腹胀满，脾虚腹泻。

【用法与用量】 6~12g。

【贮藏】 密闭，置干燥处，防潮。

饮片 饮片