

## 煅铁落

### Duantieluo

本品为生铁煅至红赤，外层氧化被锤落的铁屑经煅淬而成。

**【炮制】** 取铁落，除去杂质，照煅淬法（附录I）煅透，醋淬，干燥。

**【性状】** 本品呈不规则小碎片、颗粒或粉末，铁灰色或灰黑色，具金属光泽。体重，质脆。微有醋香气。

**【鉴别】** 取本品约 0.1g，加盐酸 2ml，振摇，静置，上清液显铁盐的鉴别反应（《中国药典》2020 版四部通则 0301）。

**【含量测定】** 取本品，研细，取约 0.15g，精密称定，置锥形瓶中，加盐酸 15ml 与 25%氟化钾溶液 3ml，盖上表面皿，加热至微沸，滴加 6%氯化亚锡溶液，不断摇动，待溶解完全，取下，用少量水冲洗表面皿及瓶内壁，趁热滴加 6%氯化亚锡溶液至显浅黄色（如氯化亚锡加过量，可滴加高锰酸钾试剂至显浅黄色），加水 100ml 与 25%钨酸钠溶液 15 滴，并滴加 1%三氯化钛溶液至显蓝色，再小心滴加重铬酸钾滴定液（0.01667mol/L）至蓝色刚好退尽，立即加硫酸-磷酸-水（2：3：5）混合溶液 10ml 与二苯胺磺酸钠指示剂 5 滴，用重铬酸钾滴定液（0.01667mol/L）滴定至溶液显稳定的蓝紫色。每 1ml 重铬酸钾滴定液（0.01667mol/L）相当于 5.585mg 的铁（Fe）。

本品含铁（Fe）不得少于 50.0%。

**【性味与归经】** 辛，凉。归心、肝经。

**【功能与主治】** 平肝，镇惊，解毒敛疮，补血。用于惊风癫痫，心悸易惊，风湿痹痛，疮疡肿痛，贫血。

**【用法与用量】** 10~15g。或入丸散。

**【贮藏】** 置干燥处。