

湘桑白皮

Xiangsangbaipi

本品为桑科植物鸡桑 *Morus australis* Poir.、华桑 *Morus cathayana* Hemsl.或蒙桑 *Morus mongolica* (Bur.) Schneid.的干燥根皮的炮制加工品。

【炮制】 取药材，除去杂质，刮去粗皮，洗净，稍润，切丝，干燥。

【性状】 本品呈曲直不一的丝条状。表面白色或淡黄白色，切面类白色。体轻，质韧，纤维性强。气微，味微甘。

【鉴别】 取本品粉末 2g，加饱和碳酸钠溶液 20ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液加稀盐酸调节 pH 值至 1~2，静置 30 分钟，滤过，滤液用乙酸乙酯振摇提取 2 次，每次 10ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取桑白皮对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一聚酰胺薄膜上，以醋酸为展开剂，展开约 10cm，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的两个荧光主斑点。

【检查】 水分 不得过 10.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法（《中国药典》四部通则 2201）测定，用 70%乙醇作溶剂，不得少于 8.0%。

【性味与归经】 甘，寒。归肺经。

【功能与主治】 泻肺平喘，利水消肿。用于肺热喘咳，水肿胀满尿少，面目肌肤浮肿。

【用法与用量】 6~12g。

【贮藏】 置干燥处，防潮，防蛀。