

## 力曲

### liqu

本品为辣蓼、青蒿、苍耳草等十九味，经发酵而成的曲块的炮制加工品。

**【炮制】** 取药材，碎成小块或颗粒。

**【性状】** 本品呈不规则小块或颗粒。表面黄棕色或黄褐色，粗糙。质轻，疏松易碎。气芳香，味微苦、微酸。

**【鉴别】** 本品粉末黄棕色或黄褐色。稃片外表皮表面观长细胞与短细胞（栓化细胞和硅质细胞）交互排列，长细胞壁厚，紧密深波状弯曲，短细胞类圆形，有稀疏壁孔（麦芽）。分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物（香附）。种皮表皮细胞为栅状，有纵沟纹，光辉带明显；表面观多角形，胞腔极小，孔沟细密；底面观细胞呈多角形，壁稍厚，胞腔大，内含红棕色至红色物质（赤小豆）。石细胞淡黄白色或黄棕色，表面观类多角形、类长圆形或贝壳形，孔纹大而密，直径 25~150 $\mu\text{m}$ （苦杏仁）。草酸钙针晶细小，长 5~30 $\mu\text{m}$ ，不规则地充塞于薄壁细胞中（苍术）。菌丝团块，无色或黄棕色，有的菌丝有分枝或呈结节状膨大（猪苓）。

**【检查】** 水分 不得过 12.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 8.5%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 2.5%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

黄曲霉毒素 照真菌毒素测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2351）测定。

本品每 1000g 含黄曲霉毒素 B<sub>1</sub> 不得过 5 $\mu\text{g}$ ，黄曲霉毒素 G<sub>2</sub>、黄曲霉毒素 G<sub>1</sub>、黄曲霉毒素 B<sub>2</sub> 和黄曲霉毒素 B<sub>1</sub> 总量不得过 10 $\mu\text{g}$ 。

**【浸出物】** 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的冷浸法测定，不得少于 21.0%。

**【性味与归经】** 辛、甘，温。归脾、胃、肺经。

**【功能与主治】** 健胃利湿，消积导滞。用于感冒风寒，肠胃积滞，胸膈饱满，腹痛吐泻。

**【用法与用量】** 泡服，每次 2.5~7.5g，每天 2 次，小儿酌减。

【贮藏】 密封，置干燥处。

化学工业出版社