

## 湘桂皮(官桂)

### Xiangguipi

本品为樟科植物川桂 *Cinnamomum wilsonii* Gamble、少花桂 *Cinnamomum pauciflorum* Nees 或毛桂 *Cinnamomum appelianum* Schewe 的干燥树皮的炮制加工品。

**【炮制】**取药材，除去杂质，洗净，润透，切宽丝或块，晾干。

**【性状】**本品为卷筒状、槽状的宽丝或不规则的块，厚 0.3~0.5cm。外表面灰棕色，粗糙，有明显的纵皱纹及横向突起的皮孔；内表面棕褐色，平滑，具细纵纹。质硬而脆，易折断。略有香气，味微甘、涩，并有凉舌感。

**【鉴别】**取本品粉末 0.5g，加乙醇 10ml，浸泡 20 分钟，时时振摇，滤过，滤液作为供试品深液。另取桂皮醛对照品，加乙醇制成每 1ml 含 1 $\mu$ l 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取供试品溶液 2~5 $\mu$ l、对照品溶液 1~2 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90℃）-乙酸乙酯（17：3）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以二硝基苯肼乙醇试液，置日光下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

**【检查】**水分不得过 13.0%（中国药典 2020 年版四部通则 0832 第四法）。

总灰分不得过 6.0%（中国药典 2020 年版四部通则 2302）。

**【浸出物】**照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 10.0%。

**【性味与归经】**辛、甘，温。归脾、胃、肝、肾经。

**【功能与主治】**温脾胃，暖肝肾，祛寒止痛，散瘀消肿。用于脘腹冷痛，呕吐泄泻，腰膝酸软，寒疝腹痛，寒湿痹痛，瘀滞痛经，血痢，肠风，跌打肿痛等。

**【用法与用量】** 6~12g。外用适量，研末用水或酒调敷。

**【注意】**阴虚火旺者忌用，有出血倾向者及孕妇慎用。

**【贮藏】**置阴凉干燥处。