## 羊开口(野牡丹)

## Yangkaikou

本品为野牡丹科植物野牡丹 Melastoma candidum D. Don 的干燥根的炮制加工品。

【炮制】 取药材,除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。

【性状】 本品为不规则的厚片,外皮灰白色、黄棕色或棕红色,平坦,有 浅的纵沟纹;皮薄,易脱落,脱落处呈浅棕黄色,有细密弯曲的纵纹。切断面浅 黄棕色或浅棕色。质硬而致密。气微,味涩。

【鉴别】 本品粉末浅黄棕色。石细胞成群或单个散在,类长方形或不规则形状,沟纹明显,直径  $21\sim95\,\mu\,m$ 。纤维成束或单个散在,长梭形或两端钝圆,纹孔明显。具缘纹孔导管多见,直径  $30\sim106\,\mu\,m$ 。草酸钙簇晶散在,或在薄壁细胞中,直径  $30\sim56\,\mu\,m$ 。

【**检查**】 水分 不得过 13.0%(《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二 法)。

总灰分 不得过 5.0%(《中国药典》2020 年版四部通则 2302)。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法(《中国药典》2020 年版四部通则 2201) 项下的热浸法测定,不得少于 11.0%。

【性味与归经】 苦、涩,凉。归脾、胃、肺、肝经。

【功能与主治】 行气利湿, 化瘀止血, 解毒。用于脘腹胀痛, 肠炎, 痢疾, 肝炎, 淋浊, 咯血, 吐血, 衄血, 便血, 月经过多, 痛经, 白带, 疝气痛, 血栓性脉管炎, 疮疡溃烂, 带状疱疹, 跌扑肿痛。

【用法与用量】  $10 \sim 15 g$ 。

【贮藏】 置干燥处。