

炒浮小麦

Chaofuxiaomai

本品为禾本科植物小麦 *Triticum aestivum* L. 的干燥轻浮瘪瘦果实的炮制加工品。

【炮制】 取浮小麦，照清炒法（附录 I）文火炒爆，取出，放凉。

【性状】 本品呈长圆形，长约 2~7mm，直径约 1.5~2.5mm。表面棕黄色或黄色，略皱缩，腹面中央有一纵行深沟，顶端钝形，具黄白色柔毛，另一端略尖，质较硬，轻浮，断面白色，有空隙，粉性。气微香，味淡。

【鉴别】 本品粉末类白色。具棕色果皮碎片。淀粉粒以单粒为主，呈扁圆形、椭圆形或三角状，直径 30~40 μ m，侧面观椭圆形，两端稍尖，直径 12~20 μ m，脐点长裂缝状，层纹少数约可见。复粒少，由 2~4 或更多分粒组成。果皮表皮细胞呈类长方形或长多角形，壁念珠状增厚。果皮中层细胞长条形或不规则形，壁念珠状增厚。管细胞呈长管状，各细胞以侧面短分枝相联结，有较大间隙，成熟时细胞彼此分离。非腺毛单细胞，长 43~950 μ m，直径 11~29 μ m，壁厚 5~11 μ m。

【检查】 水分 不得过 10.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 3.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 25.0%。

【性味与归经】 甘、咸，凉。归心经。

【功能与主治】 益气，除热，止汗。用于骨蒸劳热，自汗，盗汗。

【用法与用量】 10~30g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。