

滇桂艾纳香

Dianguiaianaxiang

本品为菊科植物假东风草 *Blumea riparia* (Bl.) DC. 和东风草 *Blumea megacephala* (Randeria) Chang et Tseng 的干燥全草的炮制加工品。

【炮制】 取药材，除去杂质，切长段，干燥。

【性状】 本品为不规则的长段。根茎膨大，直径 0.5~3cm，表面棕黄色或棕褐色，根表面可见细皱纹及突出的点状皮孔。茎圆柱形，直径 3~7mm，有的有分枝，表面紫褐色或灰绿色，具纵棱，质稍硬；切面髓部发达，白色，老茎木部呈放射状。叶多卷缩破碎，完整者展平后椭圆形，上表面灰绿色或暗绿色，下表面色稍浅，边缘具点状锯齿；质脆。有时可见头状花序。气微，味淡。

【鉴别】 取本品粉末 5g，加石油醚（60~90℃）30ml，浸泡 24 小时，滤过，滤液挥干，加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取滇桂艾纳香对照药材 5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯（12：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以磷钼酸试液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰，置日光下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 13.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 10.0%。

【性味与归经】 淡，平。归肝、脾经。

【功能与主治】 活血化瘀，止血调经。用于瘀血阻滞所致月经过多，经期过长，产后恶露不绝等症。

【用法与用量】 10~30g。外用适量。

【贮藏】 置干燥处。