

## 炒芸苔子

### Chaoyuntaizi

本品为十字花科植物芸苔 *Brassica campestris* L. 的干燥成熟种子的炮制加工品。

**【炮制】** 取芸苔子，照清炒法（附录I）炒至有爆鸣声，取出，放凉。

**【性状】** 本品呈近球形，直径 1.5~2 mm，偶有种皮鼓起。表面红褐色或黑褐色，少数呈黄色，放大镜下观察可见微细网状纹理，一端具点状种脐，色较深；一侧有一条微凹陷的浅沟，沟中央有一条凸起的棱线。种仁 2 片，淡黄色，沿中脉相重对摺，胚根位于二对摺的子叶之间。气微香，味淡，有油腻感。

**【鉴别】** 本品粉末黄棕色。种皮栅状细胞成片，黄色、棕黄色、黄棕色或红棕色，类多角形，长多角形，长 16~48 $\mu\text{m}$ ，宽 12~24 $\mu\text{m}$ ，壁厚可达 6 $\mu\text{m}$ 。种皮下皮细胞多无色，形较大，横断面观扁长圆形，外壁及侧壁皱缩，细胞界限不清。内胚乳细胞，横断面呈扁长方形，表面观多角形，直径 12~32 $\mu\text{m}$ ，含糊粉粒及脂肪油滴。子叶细胞无色或淡黄色，含糊粉粒及脂肪油滴；脂肪油滴无色或淡黄色，直径 16~160 $\mu\text{m}$ 。

**【检查】** 水分 不得过 6.0%（《中国药典》2020 年四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（《中国药典》2020 年四部通则 2302）。

**【浸出物】** 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 13.0%。

**【性味与归经】** 辛，温。归肝、大肠经。

**【功能与主治】** 行血破血，消肿散结。用于产后血滞腹痛，血痢，肿毒，痔漏。

**【用法与用量】** 5~10g。用时捣碎。外用适量，研末调敷或榨油涂抹。

**【贮藏】** 置干燥处，防蛀。