

炒黄荆子

Chaohuangjingzi

本品为马鞭草科植物牡荆 *Vitex negundo* var. *cannabifolia* (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.或黄荆 *Vitex negundo* L.的干燥成熟果实的炮制加工品。

【炮制】 取黄荆子，照清炒法（附录 I）炒至微鼓起，有香气逸出，取出，放凉。

【性状】 本品呈卵圆形，长 2~3.5mm，宽 2~3mm。顶端有花柱脱落的凹痕；宿萼钟形，灰褐色，包被果实的 2/3 或更多；萼筒顶端 5 齿裂；外面有 5~10 条纵脉纹，其中 5 条甚明显，密被灰白色短茸毛，基部具果梗。剥去宿萼，果实表面呈棕褐色，微显细纵纹，有的微具焦斑。果皮质硬，不易破裂，断面果皮较厚，黄棕色，2~4 室，每室有黄白色种子 1 枚或不育。气香，味微苦、涩。

【鉴别】 （1）本品粉末棕黄色，果皮石细胞众多，单个或成群，呈类方形、类圆形、多角形或纺锤形，直径 5~55 μ m，有的胞腔内含草酸钙方晶。中果皮薄壁细胞呈长方形，直径达 45 μ m，具纹孔。种皮网纹细胞呈多角形，直径 11~45 μ m，壁呈螺旋纹。非腺毛由 1~3 个细胞组成，直径 3~15 μ m，壁厚，具疣状突起。

（2）取本品粉末 1g，加甲醇 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 0.5ml 使溶解，作为供试品溶液。另取黄荆子对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 1~4 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸丁酯-甲醇-水（3：1：1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光主斑点。

【检查】 水分 不得过 10.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 4.5%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 7.0%。

【性味与归经】 辛、苦，温。归肺、胃、肝经。

【功能与主治】 祛风解表，止咳平喘，理气止痛，消食。用于伤风感冒，咳嗽，胃痛吞酸，消化不良，食积泻痢，疝气。

【用法与用量】 5～10g。

【注意】 湿热燥渴无气滞者忌服。

【贮藏】 置干燥处。