

# 当归炭

## Danguitan

本品为伞形科植物当归 *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels 的干燥根的炮制加工品。

**【炮制】** 取药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片或短段，干燥，照炒炭法（附录 I）炒至表面微黑色，取出，放凉。

**【性状】** 本品呈类圆形、椭圆形或不规则的厚片或短段。外表皮棕褐色，切面黑褐色，断面灰棕色。质枯脆。具焦香气，味涩。

**【鉴别】** 取本品粉末 0.5g，加乙醚 20ml，超声处理 10 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取当归对照药材 0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正己烷-乙酸乙酯（4：1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

**【检查】 水分** 不得过 10.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第四法）。

**总灰分** 不得过 8.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

**酸不溶性灰分** 不得过 2.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

**【浸出物】** 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，用 70%乙醇作溶剂，不得少于 25.0%。

**【性味与归经】** 甘、辛，温。归肝、心、脾经。

**【功能与主治】** 补血活血，调经止痛，润肠通便。用于血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，风湿痹痛，跌扑损伤，痈疽疮疡，肠燥便秘。

**【用法与用量】** 6~12g。

**【贮藏】** 置阴凉干燥处，防潮，防蛀。