

砂炒槐花炭

Shachaohuaihuatan

本品为豆科植物槐 *Sophora japonica* L. 的干燥花及花蕾的炮制加工品。

【炮制】 取槐花，照砂炒法和炒炭法（附录I）用炒至表面焦褐色，取出，筛去油砂，放凉。

【性状】 槐花炭 呈皱缩而卷曲，花瓣多散落。完整者花萼钟状，表面焦褐色，先端5浅裂；花瓣5，1片较大，近圆形，先端微凹，其余4片长圆形。雄蕊10，其中9个基部连合，花丝细长。雌蕊圆柱形，弯曲。体轻。气微，味微苦。

槐米炭 本品呈卵形或椭圆形，花萼下部有数条纵纹。萼的上方为焦褐色未开放的花瓣。花梗细小。体轻，手捻即碎。气微，味微苦涩。

【鉴别】 取本品粉末0.2g，加甲醇5ml，密塞，振摇10分钟，滤过，取滤液作为供试品溶液。另取芦丁对照品，加甲醇制成每1ml含4mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020年版四部通则0502）试验，吸取上述两种溶液各10 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯-甲酸-水（8:1:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铝试液，待乙醇挥干后，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020年版四部通则2201）项下的热浸法测定，用30%甲醇作溶剂，不得少于30.0%。

【性味与归经】 苦、微涩，微寒。归肝、脾、大肠经。

【功能与主治】 凉血止血，清肝泻火。用于便血，痔血，血痢，崩漏，吐血，通血，肝热目赤，头痛眩晕。本炮制品清热凉血作用极弱，具有止血力胜的作用。

【用法与用量】 5~10g。

【贮藏】 置干燥处，防潮，防蛀。