

糯米藤根

Nuomitenggen

本品为荨麻科植物糯米团 *Gonostegia hirta* (Bl.) Miq. 的干燥根的炮制加工品。

【炮制】 取药材，除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。

【性状】 本品呈不规则的段。表面棕褐色或黄褐色，切面可见较多的纤维，皮部较厚，木部棕黄色，皮部与木质部易剥离。质较坚硬，易折断，稍具粉性。气微，味淡，嚼之有黏性且成团。

【鉴别】 (1) 本品粉末黄白色。网纹导管多见，直径 $20\sim 51\mu\text{m}$ 。淀粉粒多为单粒，类球形、长圆形、卵圆形或不规则形，直径 $10\sim 40\mu\text{m}$ ，脐点裂缝状或点状，层纹不明显；复粒少，多为 2 分粒组成。纤维长棱形，多不完整，淡黄色，直径约 $35\mu\text{m}$ ，壁厚，胞腔狭窄。不规则团状块物棕黄色或红棕色，大小不一。

(2) 取本品粉末 3g，加乙醇 30ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加水 20ml，用乙酸乙酯提取 2 次，每次 10ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取糯米藤根对照药材 3g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 $2\sim 4\mu\text{l}$ ，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯—乙酸乙酯—甲酸（7：2：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 硫酸乙醇溶液， 105°C 加热至斑点显色清晰，置日光下检视。供试品色谱中，在与对照药材相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 16.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 11.5%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 4.5%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 11.0%。

【性味与归经】 甘、微苦，凉。归脾、胃经。

【功能与主治】 健脾消食，清热利湿。用于食积胀满，带下，疮疖。

【用法与用量】 $15\sim 30\text{g}$ 。外用适量。

【贮藏】 置干燥处。