

醋制三棱

Cuzhisanleng

本品为黑三棱科植物黑三棱 *Sparganium stoloniferum* Buch.-Ham. 的干燥块茎的炮制加工品。

【炮制】 取药材，照醋煮法（附录 I）煮透，切薄片，干燥；或取三棱片，照醋煮法（附录 I）煮透，干燥。

每 100kg 三棱，用米醋 20kg。

【性状】 本品呈类圆形的薄片。外表皮灰棕色。切面黄色至黄棕色，粗糙，有多数明显的细筋脉点。微有醋香气，味淡，嚼之微有麻辣感。

【鉴别】 取本品粉末 2g，加乙醇 30ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取三棱对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90℃）-乙酸乙酯（4：1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 13.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 5.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 7.5%。

【性味与归经】 辛、苦，平。归肝、脾经。

【功能与主治】 破血行气，消积止痛。用于癥瘕痞块，痛经，瘀血经闭，胸痹心痛，食积胀痛。

【用法与用量】 5~10g。

【注意】 孕妇禁用；不宜与芒硝、玄明粉同用。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。