

醋制没药

Cuzhimoyao

本品为橄榄科植物地丁树 *Commiphora myrrha* Engl.或哈地丁树 *Commiphora molmol* Engl.的干燥树脂的炮制加工品。

【炮制】 取药材，除去杂质，照醋炙法（附录 I）炒至表面光亮，取出，放凉。

每 100kg 没药，用醋 10kg。

【性状】 本品呈不规则小块状或颗粒状。表面棕褐色至黑褐色，有光泽。质坚脆。具特异香气，略有醋香气，味苦而微辛。

【鉴别】（1）本品粉末黄棕色、棕褐色或黑褐色。不规则团块较多，半透明，无色或表面有黄棕色至红棕色色素。树脂块黄棕色至红棕色。不规则碎块淡黄色，半透明，碎块洞穴中有时含有微黄色油滴。

（2）取【含量测定】项下的挥发油适量，加环己烷制成每 1ml 含天然没药 10mg 或胶质没药 50mg 的溶液，作为供试品溶液。另取天然没药对照药材或胶质没药对照药材各 2g，照挥发油测定（《中国药典》2020 年版四部通则 2204 乙法）加环己烷 2ml，缓慢加热至沸，并保持微沸约 2.5 小时，放置后，取环己烷溶液作为对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 3 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以环己烷-乙醚（4：1）为展开剂，展开，取出，晾干，立即喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰，置日光下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水、醇不溶物 取本品约 5g，精密称定，置已干燥至恒重的 50ml 离心管中，加水 35ml，置沸水浴中加热 5 分钟，时时搅拌，离心，倾去上清液；残渣自“加水 35ml”起，重复操作 1 次；残渣再加乙醇适量，置热水浴中微热，时时搅拌，离心，倾去上清液；残渣自“再加乙醇适量”起，重复上述操作 1 次，残渣于 105℃干燥 1 小时，置干燥器中冷却 30 分钟，迅速精密称定重量。计算供试品中水、醇不溶物的含量。

本品含水、醇不溶物不得过 20.0%。

总灰分 不得过 15.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 8.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【含量测定】 取本品适量，精密称定，照挥发油测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2204 乙法）测定。

本品含挥发油不得少于 0.50%（ml/g）。

【性味与归经】 辛、苦，平。归心、肝、脾经。

【功能与主治】 散瘀定痛、消肿生肌。用于胸痹心痛，胃脘疼痛，痛经经闭，产后瘀阻，癥瘕腹痛，风湿痹痛，跌扑损伤，痈肿疮疡。

【用法与用量】 3～5g，多入丸散。外用适量，研末调敷。

【注意】 孕妇及胃弱者慎用。

【贮藏】 置阴凉干燥处。