

饮片标准

蛋黄油

Danhuangyou

本品为雉科动物家鸡 *Gallus gallus domesticus* Brisson 鲜卵的卵黄提取物的炮制加工品。

【炮制】 取鲜鸡蛋，用打蛋机或手工破碎后，分取蛋黄，经加热脱水，制成干燥蛋黄粉，再经专用分离仪分离出蛋黄提取物，高压灭菌；或取鲜鸡蛋煮熟，去壳取黄，置锅内以文火加热，待水分蒸发后，再用大火，熬出油脂。取原品。

【性状】 本品为呈棕红色至棕褐色的黏稠状物，气微腥。温度低时，凝固成棕黄色至棕褐色半固体。气微腥。

【鉴别】 取本品 0.1g，加二三氯甲烷 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取卵磷脂对照品，加二三氯甲烷制成每 1ml 中含 2mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以二三氯甲烷-甲醇-冰醋酸-乙醇-水（25：4：6：2：0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以改良碘化铋钾试液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的红色斑点。

【检查】 酸值 不得过 4.0（供内服用）或 20.0（《中国药典》2025 年版四部通则 0713）。

皂化值 应为 162～188（《中国药典》2025 年版四部通则 0713）。

碘值 应为 68～93（《中国药典》2025 年版四部通则 0713）。

过氧化值 取本品 1.0g，加冰醋酸-三氯甲烷（6：1）的混合溶

液 30ml，振摇使溶解，加碘化钾饱和溶液 1ml，振摇 1 分钟，加水 100ml 与淀粉指示剂 1ml，用硫代硫酸钠滴定液（0.01mol/L）滴定，至紫蓝色消失，并将滴定结果用空白校正，消耗硫代硫酸钠滴定液（0.01mol/L）不得过 1.5ml。

水分与挥发物 不得过 1.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 0713）

【微生物限度】 照非无菌产品微生物限度检查：微生物计数法（《中国药典》2025 年版四部通则 1105）和控制菌检查法（《中国药典》2025 年版四部通则 1106）及非无菌药品微生物限度标准（《中国药典》2025 年版四部通则 1107）检查。需氧菌总数每 1g 不得过 10^2 cfu、霉菌和酵母菌总数每 1g 不得过 10^2 cfu、耐胆盐革兰阴性菌每 1g 不得过 10^4 cfu、每 1g 不得检出金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌及大肠埃希菌、每 10g 不得检出沙门菌。

【性味与归经】 甘，平。归脾经。

【功能与主治】 敛疮生肌。用于湿疹，皮肤瘙痒，烫伤，手足皲裂等。

【用法与用量】 内服 0.5~5ml。外用适量，涂搽或滴耳。或遵医嘱。

【注意】 本品限用于表皮完整。

【贮藏】 避光，密封，置阴凉处。