

酢浆草

Cujiangcao

OXALIDIS CORNICULATAE HERBA

本品为酢浆草科植物酢浆草 *Oxalis corniculata* L. 的干燥全草。

夏、秋二季采收，除去泥沙及杂质，干燥。

【民族药名】 席阿皮皮（土家），芮江先江求（苗），骂登辰（侗），老鸦酸（瑶）。

【性状】 本品多扭曲成团状或呈不规则的段，全株被疏毛。根呈圆柱状，有纵纹，表面棕色或红棕色。茎草质，多分支，节上生根。三出复叶基生或茎上互生，小叶 3 枚，叶片多皱缩破碎，棕绿色，叶完整者展开后小叶倒心形，无柄，全缘。花单生或伞形花序腋生，黄色至黄棕色，多已干缩。蒴果近圆柱形，有 5 棱，被短柔毛。味酸涩、微咸。

【鉴别】（1）本品茎横切面：表皮细胞外被角质层，可见外壁粗糙或具疣状突起的单细胞非腺毛。皮层细胞 2~5 列，靠近中柱鞘部位薄壁细胞有的含草酸钙方晶，直径 8~20 μm 。中柱鞘纤维排列成环。维管束外韧型，形成层不明显。髓部薄壁细胞类圆形或多角形，有的含草酸钙方晶，直径 6~25 μm 。

（2）取本品粉末 2g，加乙酸乙酯-甲酸（95：5）的混合溶液 20ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙酸乙酯 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取酢浆草对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上

述两种溶液各 4 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（20：4：0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 13.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二法）。

酸不溶性灰分 不得过 6.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2025 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 17%。

【性味与归经】 酸，寒。归肝、肺、膀胱经。

土家医 酸，微冷。

苗医 酸、咸，微冷。

侗医 酸，寒。

瑶医 酸，寒。

【功能与主治】 清热利湿，凉血散瘀，消肿解毒。用于咽喉肿痛，口疮，泄泻，痢疾，黄疸，淋症，赤白带下，疔疮，疥癣，跌扑损伤等。

土家医 收涩止泻，利湿消肿，活血疗伤，敛疮。用于水泻，气子肿痛，跌扑损伤，痞积，肥疮。

苗医 清热利湿，凉血散瘀，消肿解毒。用于伤暑，泄泻，痢疾，黄疸，淋症，赤白带下，麻疹，吐血，衄血，咽喉肿痛，疔疮，痈肿，

疥癬，痔瘡，脫肛，跌撲損傷，燙火傷。

侗医 清火解毒，涼血消腫，解癢止痛。用于濕疹，疥癬，痔瘡，麻疹，燙火傷，蛇竄瘡，蛇蟲咬傷。

瑶医 清熱利濕，涼血散瘀，解毒消腫。用于黃疸，痢疾，瘡疖，跌撲損傷。

【用法与用量】 9~15g。外用適量，搗敷或煎水洗或煎水漱口。

土家医 10~15g。外用適量。

苗医 10~15g。外用適量，煎水洗或搗敷或煎水漱口。

侗医 15~30g。外用適量。

瑶医 10~30g。外用適量。

【贮藏】 置通風干燥處。

起草單位：株洲市食品藥品檢驗所

復核單位：衡陽市市場監督檢驗檢測中心