

地板藤

Dibanteng

FICI TIKOUAE CAULIS

本品为桑科植物地果 *Ficus tikoua* Bur.的干燥藤茎。夏、秋二季采收，除去杂质，洗净，干燥。

【性状】 本品呈圆柱形，有的略扁，稍扭曲，长短不一，直径0.3~4cm。表面棕褐色，粗糙，散在点状皮孔；节处略膨大，腹面多有不定根或不定根残痕。质稍硬脆，易折断。断面皮部窄，黄棕色，木部黄色，髓部小，有的中空，常偏于一侧。气微，味苦、微涩。

【鉴别】 取本品粉末2g，加甲醇30ml，浸泡1小时，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取地瓜藤对照药材2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2025年版四部通则0502)试验，吸取上述两种溶液各2 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷-丙酮(8:3)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰，置日光及紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点和荧光斑点。

【检查】 杂质 不得过3% (《中国药典》2025年版四部通则2301)。

水分 不得过12.0% (《中国药典》2025年版四部通则0832 第二法)。

总灰分 不得过10.0% (《中国药典》2025年版四部通则2302)。

酸不溶性灰分 不得过 1.5%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2025 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 11%。

【性味与归经】 苦，寒。归肺、肝、脾经。

【功能与主治】 清热利湿，活血通络，解毒消肿。用于肺热咳嗽，痢疾，水肿，黄疸，风湿痹痛，经闭，带下，跌扑损伤，无名肿毒。

【用法与用量】 10～25g。

【贮藏】 置干燥处。

起草单位：湖南省药品检验检测研究院

复核单位：益阳市食品药品检验所