

勾儿茶

Gou'ercha

BERCHEMIAE FLORIBUNDAE CAULIS

本品为鼠李科植物多花勾儿茶 *Berchemia floribunda* (Wall.) Brongn. 的干燥茎。夏、秋二季采集，切段，晒干。

【性状】 本品呈长圆柱形，有分枝，长短不一，直径 0.5~11.5cm。表面棕褐色，有明显的纵皱纹；质坚硬，不易折断。断面棕黄色或黄棕色，密布针孔样导管，同心环纹不甚明显。髓小居中，棕色。气微，味淡、微涩。

【鉴别】 本品粉末棕黄色或黄棕色。薄壁细胞类长方形、椭圆形或不规则形，近无色，直径 2~10 μm ，壁连珠状增厚，木化。晶纤维多成束，淡黄色或近无色，直径 12~45 μm ，内含草酸钙方晶。草酸钙方晶 1~12 μm ，棱角多短钝。纤维多成束，直径 7~15 μm 。导管主为网纹导管和具缘纹孔导管，近无色或淡黄色，直径 30~55 μm 。

【检查】 水分 不得过 13.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 7.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2025 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 6.5%。

【性味与归经】 甘、微涩，微温。归肝、大肠经。

【功能与主治】 祛风除湿，活血止痛。用于风湿痹痛，胃痛，痛经，产后腹痛，跌扑损伤。

【用法与用量】 15～30g。外用适量，浸酒外搽。

【贮藏】 置通风干燥处。

起草单位：湖南省中医药研究院

湖南中医药大学

复核单位：长沙市食品药品检验所