

荷叶蒂

Heyedi

NELUMBINIS STIPITIUM

本品为睡莲科植物莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 的干燥叶基部。夏、秋二季采收荷叶，将叶片基部连同叶柄顶端剪下，干燥。

【性状】 本品为荷叶中央近叶柄处剪下的叶基，近圆形、半笠形、半圆形或菱形，直径 6~7cm。上表面黄绿色、深绿色或紫褐色，较粗糙，叶脉微凹，自中央向外辐射状散出。下表面棕黄色，有光泽，叶脉突起，自中央向外辐射状散出，中央有长约 1cm 的残存叶柄基，其横断面可见数个大小不等的孔。质轻而松脆。气微，味涩。

【鉴别】 本品粉末灰绿色。上表皮细胞表面观多角形，外壁乳头状或短绒毛状突起，呈双圆圈状；断面观长方形，外壁呈乳头状突起；气孔不定式，副卫细胞 5~8 个。下表皮细胞表面观垂周壁略波状弯曲，有时可见连珠状增厚。草酸钙簇晶多见，直径约至 40 μ m。

【检查】 水分 不得过 13.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 14.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.5%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2025 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 18%。

【性味与归经】 苦、涩，平。归脾、胃、肝经。

【功能与主治】 解暑去湿，止血，安胎。用于暑湿泄泻，血痢，崩漏下血，妊娠胎动不安。

【用法与用量】 5~10g。

【贮藏】 置通风干燥处。

起草单位：湖南省药品检验检测研究院

复核单位：长沙市食品药品检验所