

紫荆皮

Zijingpi

CERCIS CHINENSIS CORTEX

本品为豆科植物紫荆 *Cercis chinensis* Bunge 的干燥树皮。7~8 月剥取，晒干。

【性状】 本品呈筒状、槽状或不规则的块片，向内卷曲。外表面棕褐色或灰褐色，有皱纹；常显鳞甲状；内表面紫棕色或红棕色，有细纵纹理。质坚实，不易折断，断面灰红色，对光照可见细小亮点。气微，味涩。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为数列棕色细胞。皮层中有石细胞群、纤维束及晶纤维束，石细胞壁较薄。射线喇叭状，韧皮部中散在纤维及草酸钙棱晶。薄壁细胞内充满淀粉粒。

粉末红棕色。韧皮纤维长梭形，壁较厚，单个散在或成束，有的周围薄壁细胞含有草酸钙晶体，形成晶纤维。草酸钙棱晶直径 20~30 μm 。石细胞类圆形、类方形或类长方形，壁较薄，直径 20~89 μm 。淀粉粒众多，单粒类圆形、类三角形或不规则形，直径为 2~10 μm ，脐点呈点状、裂缝状或人字状，复粒由 2~6 分粒组成。

【检查】 水分 不得过 13.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 12.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2025 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 19%。

【性味与归经】 苦，平。归肝经。

【功能与主治】 活血，解毒消肿。用于跌扑损伤，月经不调，瘀滞腹痛，痈肿，疥癣。

【用法与用量】 6～15g。外用适量，研粉调敷。

【注意】 孕妇禁用。

【贮藏】 置干燥处。

起草单位：湖南省中医药研究院

复核单位：湖南省药品检验检测研究院