

墓头回

Mutouhui

PATRINIAE RADIX

本品为败酱科植物糙叶败酱 *Patrinia scabra* Bunge 或异叶败酱 *Patrinia heterophylla* Bunge 的干燥根。秋季采挖，除去残茎及泥土，洗净，晒干。

【性状】 糙叶败酱 本品呈不规则圆柱形，长短不一，常弯曲，直径 0.4~5cm。根头部粗大，有的分枝。表面棕褐色，粗糙皱缩，有的具瘤状突起。栓皮易剥落，脱落后呈棕黄色。体轻，质松；断面黄白色至淡棕黄色，纤维性，可见放射状裂隙。具特异臭气，味微苦。

异叶败酱 呈细圆柱形，有分枝。表面黄褐色，有细纵纹及点状支根痕，有的具瘤状突起。质硬，断面黄白色，呈破裂状，臭气较淡。

【鉴别】（1）本品横切面：木栓层 15~25 列细胞，黄棕色。栓内层 1~3 列，皮层细胞椭圆形或类圆形，常有裂隙。韧皮部窄，束间形成层不明显。初生木质部 6~9 原型。木质部导管径向散列或数个相聚，可见木纤维，薄壁细胞含草酸钙簇晶。

粉末灰棕色至深棕色。木栓细胞类长方形，淡黄棕色，切向排列整齐。棕色块状物多见，不规则块状，大小不一。纤维多成束，细长，平直或略弯曲，细胞壁厚，胞腔线形。石细胞偶见，成群或单个散在，呈类方形，纹孔细密，孔沟细而明显。螺纹导管、网纹导管常见。草酸钙簇晶众多，呈类圆形或不规则形。

（2）取本品粉末 4g，置索氏提取器中，加石油醚（60~90℃）

150ml，加热回流 3 小时，弃去石油醚液，药渣挥干溶剂，加稀乙醇 150ml，加热回流 3 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加水 40ml 使溶解，加盐酸 2ml，加热回流 2 小时，放冷，用乙酸乙酯振摇提取 3 次，每次 15ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取墓头回对照药材 4g，同法制成对照药材溶液。再取齐墩果酸对照品，加甲醇制成每 1ml 含 0.1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述三种溶液各 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（20：3：0.2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10% 硫酸乙醇溶液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 12.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 9.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 3.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2025 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇为溶剂，不得少于 17%。

【性味与归经】 苦、微酸、涩，凉。归心、肝、肾经。

【功能与主治】 清热解毒，收敛止血，燥湿止带。用于带下，崩漏，肠痈。

【用法与用量】 9～15g。外用适量。

【贮藏】 置通风干燥处。

起草单位：湖南省中医药研究院

复核单位：湖南省药品检验检测研究院