小麦芽

Xiaomaiya

本品为禾本科植物小麦 Triticum aestivum L. 的成熟果实经发芽干燥而得的炮制加工品。

【炮制】 取药材,除去杂质。

【性状】 本品呈长椭圆形,长 5~7mm,直径约 3mm。表面淡黄棕色,全体较皱缩,腹面中央有一条纵沟,顶端具黄白色柔毛;基部有一胚芽及数条须根,胚芽呈长披针形,长约 0.5cm,须根纤细而弯曲。质硬,断面白色,粉性。气香,味微甘。

【检查】 水分 不得过 13.0% (《中国药典》 2020 年版四部通则 0832 第二法)。

出**芽率** 取本品 10g, 照药材取样法(《中国药典》2020 年版四部通则 0211), 取对角两份供试品,检查出芽粒数与总粒数,计算出芽率(%)。

本品出芽率不得少于90%。

黄曲霉毒素 照真菌毒素测定法(《中国药典》 2020 年版四部通则通则 2351)测定。

本品每 1000g 含黄曲霉毒素 B_1 不得过 $5\mu g$,黄曲霉毒素 G_2 、黄曲霉毒素 G_1 、黄曲霉毒素 B_2 和黄曲霉毒素 B_1 的总量不得过 $10\mu g$ 。

【性味与归经】 甘,平。归脾、胃经。

【功能与主治】 行气消食,健脾开胃,退乳消胀。用于脾虚食少,乳汁郁积。

【用法与用量】 $9\sim15g$ 。

【贮藏】 置干燥处,防蛀。