

焦小麦芽

Jiaoxiaomaiya

本品为禾本科植物小麦 *Triticum aestivum* L. 的成熟果实经发芽干燥而得的炮制加工品。

【炮制】 取麦芽，照清炒法（附录 I），炒至焦褐色，取出，放凉。

【性状】 本品呈长椭圆形，长 5~7mm，直径约 3mm。表面棕褐色，全体较皱缩，腹面中央有一条纵沟，顶端具黄白色柔毛；基部有一胚芽及数条须根，胚芽呈长披针形，长约 0.5cm，须根纤细而弯曲。质硬，断面白色，粉性。气焦香，味微甘。

【检查】 水分 不得过 13.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

出芽率 取本品 10g，照药材取样法（《中国药典》2020 年版四部通则 0211），取对角两份供试品，检查出芽粒数与总粒数，计算出芽率（%）。

本品出芽率不得少于 90%。

黄曲霉毒素 照真菌毒素测定法（《中国药典》2020 年版四部通则通则 2351）测定。

本品每 1000g 含黄曲霉毒素 B₁ 不得过 5μg，黄曲霉毒素 G₂、黄曲霉毒素 G₁、黄曲霉毒素 B₂ 和黄曲霉毒素 B₁ 的总量不得过 10μg。

【性味与归经】 甘，平。归脾、胃经。

【功能与主治】 行气消食，健脾开胃，退乳消胀。用于食积不消，脘腹胀痛。

【用法与用量】 9~15g。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。