

香墨

Xiangmo

ATRAMENTUM AROMATICUM

本品为松烟、明胶、冰片、薄荷素油等加工制成的墨。

【制法】 取冰片粉碎，过 60 目筛，备用；取胶囊用明胶加 0.5～1 倍量水，水浴加热熬成胶浆（流动呈线性不间断），备用；取松烟（过 30 目筛）置搅拌和料机，趁热加入胶浆，正反交替搅拌，制成软材；取软材置木墩上，涂撒冰片粉，喷洒少量薄荷素油溶液，用不锈钢锤反复翻卷捶打，重复操作至冰片及薄荷素油与软材混合均匀；切成长方块或置模具中压制成型，阴干，即得。

每 51.0kg 松烟，用 38.5kg 胶囊用明胶、0.5kg 冰片、100ml 薄荷素油。

【性状】 本品呈方柱形、扁长方柱形或不规则长条形。表面黑色，微显光泽，有白色星点（冰片）及细小孔隙。质硬。具墨香气，味淡。

【鉴别】 取本品粉末 20g，置烧瓶中，加水 250ml，照挥发油测定法（《中国药典》2025 年版四部通则 2204 甲法）试验，自挥发油测定器上端加水使充满刻度部分，并溢流入烧瓶时为止，再加石油醚（60～90℃）1.5ml，连接回流冷凝管。加热至沸并保持微沸 1 小时，放冷，分取石油醚液，作为供试品溶液。另取冰片对照品适量，加乙酸乙酯制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚(30～60℃)-乙酸乙酯

(17:3) 为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5%香草醛硫酸溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 13.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 10.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 3.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

【性味与归经】 辛、涩，平。归心、肝、肾经。

【功能与主治】 清热，止血，消肿，杀“粘虫”，明目。用于肾热，鼻衄，月经过多，创伤出血，脱发，“粘热”等症。

【用法与用量】 研粉 1~3g，或入丸、散。外用适量，研粉敷。

【贮藏】 置干燥处。

起草单位：湘西土家族苗族自治州食品药品检验所

复核单位：娄底市食品药品检验检测所