

苦丁茶

Kudingcha

ILICIS FOLIUM

本品为冬青科植物大叶冬青 *Ilex latifolia* Thunb.、扣树 *Ilex kaushue* S. Y. Hu 的干燥叶或枸骨 *Ilex cornuta* Lindl. ex Paxt. 的干燥嫩叶。清明前后采摘，除去杂质，晾干或晒干。

【性状】 大叶冬青 呈卵状椭圆形或椭圆形，有的破碎或纵向微卷曲，长 5~20cm，宽 3~9cm。上表面黄绿色、灰绿色或黄棕色，有光泽，主脉凹陷；下表面色略浅，主脉凸起。先端钝或渐尖，基部稍圆或阔楔形，叶缘有疏齿，齿尖黑色，有的具叶柄，粗短。革质而厚。气微，味微苦。

扣树 呈长圆状椭圆形，长 6~25cm，宽 3~8cm。先端锐尖或稍圆，基部钝，叶缘有疏齿。上表面青黄色或青灰色，有光泽；下表面色稍浅；主脉于上表面凹下，于下表面凸出，网脉可见，叶柄直径 2~3mm。革质。气微，味苦，微甘。

枸骨 呈四角状长圆形或卵形，长 1.5~8cm，宽 1~3cm。先端具 3 枚较大的硬刺齿，顶端 1 枚常反曲，基部平截或宽楔形，两侧各有刺齿 1~3 枚，偶见 4 枚。边缘稍反卷；长卵圆形叶两侧常无刺齿。上表面黄绿色或黄褐色，有光泽，下表面灰黄色或灰绿色。叶脉羽状，叶柄较短。革质。气微，味微苦。

【鉴别】 本品叶表面观：**大叶冬青** 上表皮细胞多角形或类圆形，垂周壁呈连珠状增厚。下表皮细胞不规则，垂周壁呈连珠状增厚。

气孔较多，环式，副卫细胞 4~6 个，另有散在的凹陷气孔。被数层表皮细胞环绕。

扣树 上表皮细胞不规则形，垂周壁浅波状或较平直，角质层较厚，可见细小的疣状突起。下表皮细胞不规则，气孔较多，不定式，保卫细胞肾形，副卫细胞 3~4 个。

枸骨 上表皮细胞不规则多边形，下表皮细胞多呈多角形，壁稍薄，孔沟不明显；气孔较密，不定式。

【检查】 水分 不得过 11.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 9.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

【性味与归经】 苦、甘，寒。归肝、肺、胃经。

【功能与主治】 散风热，清头目，除烦渴。用于头痛，齿痛，目赤，耳鸣，耳中流脓，热病烦渴。

【用法与用量】 3~10g。

【贮藏】 置干燥处。

起草单位：湖南省中医药研究院

复核单位：怀化市检验检测中心