

鼠妇虫

Shufuchong

ARMADILLIDIUM

本品为平甲虫科动物平甲虫 *Armadillidium vulgare* Latreille 的干燥体。4~9 月捕捉后用沸水烫死，晒干或焙干。

【性状】 本品呈扁椭圆形，多卷曲为近球形或半球形，长 5~12mm，宽 3~6mm。表面灰白色至灰色，具光泽。头部长方形，有眼 1 对，可见触角 1 对，各 6 节，多已脱落。背部隆起，腹部内陷，由许多近平行的环节构成。胸节 7，每节有同形足 1 对，腹部较短，分 5 节。尾肢扁平，外肢与第 5 腹节嵌合齐平。质脆，易碎。气腥臭。

【鉴别】 (1) 本品粉末浅棕灰色或淡黄棕色。刚毛浅棕色、黄棕色或无色，透明或半透明，常碎断，有的有纵向裂纹，顶端钝圆，基部稍缢缩，有的髓腔内有棕绿色物。横纹肌纤维较多，近无色或淡黄色，具波状的细密横纹。体壁碎片棕黄色或近无色，表面具鳞片状突起，有的表面可见毛窝，侧面观呈乳头状，并布有灰色细小颗粒。

(2) 取本品粉末 1g，加无水乙醇 25ml，加热回流 30 分钟，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加无水乙醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取鼠妇虫对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。再取脯氨酸对照品、丙氨酸对照品，分别加无水乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述四种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（4：1：2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以

0.5%茛三酮丙酮溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 杂质 不得过 3%（《中国药典》2025 年版四部通则 2301）

水分 不得过 10.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二法）。

酸不溶性灰分 不得过 5.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2025 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 16%。

【性味与归经】 酸、咸，凉。归肝、肾经。

【功能与主治】 破瘀消癥，通经利水，解毒，止痛。用于疟母，血瘕，惊瘕，小便不利，鹅口疮，牙痛。

【用法与用量】 3～6g。外用适量，研粉调敷。

【注意】 孕妇禁用。

【贮藏】 密闭，置阴凉干燥处，防蛀。

起草单位：湖南省中医药研究院

复核单位：湖南省药品检验检测研究院