附件 1：

《湖南省中药材标准》（2026）拟收载品种质量标准草案征求意见采纳情况

序号	品种名	意见内容	是否采纳	来源
1	虫白蜡	根据文献考证、民间习用及药效学实验结果，建议将【功能与主治】由“止血，生肌，定痛。用于金疮出血，尿血，便血，疮疡久溃不散”修改为“生肌止血，定痛补虚，续筋接骨。用于金疮出血，尿血，便血，疮疡久溃不散，气血亏虚，跌打损伤，筋伤骨折，瘀肿疼痛”。	是	电子邮件
2	虫白蜡	根据文献考证、民间习用及药效学实验结果，建议修订【用法与用量】项下的用量。	是	电子邮件
3	蛋黄油	根据文献考证及临床应用调研结果，蛋黄油在烫伤、肛肠科术后创面愈合、褥疮等病症具有促进伤口愈合的药理作用和临床运用，充分说明了其临床可用于表皮破损的创面修复。因此，建议删除【注意】项“本品限用于表皮完整”。	是	电子邮件
4	茯茶	考虑到安全性风险，建议【检查】项中增加含氟量，限度拟定为“本品按干燥品计算，每 1kg 茯茶含氟量不得过 300mg”。	是	电子邮件
5	茯茶	因冠突散囊菌为茯茶的标志菌株，为更好的控制药材质量，建议【检查】项中增加冠突散囊菌，限度拟定为“本品每 1g 含冠突散囊菌不得少于 200000cfu”。	是	电子邮件
6	茯茶	因茶褐素是茶叶渥堆发酵代谢产物茶色素的一种，具有降血脂、降血糖作用。为更好的控制药材质量，建议【含量测定】项增加以茶褐素	是	电子邮件

序号	品种名	意见内容	是否采纳	来源
		为指标成分的【含量测定】项，限度拟定为“本品按干燥品计算，含茶褐素不得少于5.0%”。		
7	绿豆	经查询，现有14个外省（市）地方标准收载了绿豆，其中12个省（市）未将【含量测定】项列入质量标准；同时，新增【含量测定】项会延长检验周期和增加企业成本。建议以牡荆苷和异牡荆苷为指标成分的【含量测定】项不列入质量标准。	是	电子邮件
8	肾茶	结合文献考证、外省（市）地方标准及现代药理与药效学研究数据，建议【用法与用量】的用量由“30～60g”修改为“10～20g”。	是	电子邮件
9	桃胶	经查询，现有4个外省（市）地方标准收载了桃胶，均未将【特征图谱】列入质量标准；同时，【特征图谱】项研究过程中未对蔷薇科桃或山桃以外植物分泌物开展研究，且新增【特征图谱】项会延长检验周期，增加企业成本。建议【特征图谱】项不列入质量标准。	是	电子邮件
10	桃胶	经查询，现有4个外省（市）地方标准收载了桃胶，均未将重金属及有害元素项列入质量标准；同时，研究批次的重金属及有害元素均符合规定，说明桃胶重金属超标可能性极低。建议【检查】项下的重金属及有害元素项不列入质量标准。	是	电子邮件
11	桐叶	质量标准中已有以齐墩果酸与熊果酸为指标成分的【含量测定】项控制药材质量；同时，毛蕊花糖苷存在于多种药用植物中，专属性不强。建议以毛蕊花糖苷为指标成分的【含量测定】项不列入质量标准。	是	电子邮件

序号	品种名	意见内容	是否采纳	来源
12	鲜乌鳢	因制剂投料需求，建议将采收与加工中的“除去内脏、鳞鳍及鳃，鲜用”修改为“除去内脏及鳃，鲜用”。	是	电子邮件
13	显齿蛇葡萄（莓茶）	建议将采收时间由“春至夏初采摘”修改为“春、夏、秋三季采摘”。	是	电子邮件
14	血风藤	因测定不同产地血风藤直径均大于质量标准中规定的范围。建议删除【性状】中关于直径的描述即“直径 0.5～3cm”，或修订直径描述。	是	电子邮件
15	羊蹄根	根据野外调研，羊蹄在秋季发芽生长，至次年夏初结实后枯萎，与质量标准中规定的采收时间即“秋季茎叶枯萎或次春发芽前采挖”有差异，建议修订采收时间。	是	电子邮件
16	鬼针草（金盏银盘）	鬼针草作为药用，主要来源于野生和栽培。标准已收载基原鬼针草（*Bidens pilosa* L.）、金盏银盘（*Bidens biternata* (Lour.) Merr. et Sherff）常与白花鬼针草（*Bidens pilosa* var. *radiata* Sch.-Bip.）在野外常混生伴生，采收时常一起采收，且干燥后难以区分；且南方地区以栽培白花鬼针草为主。因此，建议新增基原白花鬼针草（*Bidens pilosa* var. *radiata* Sch.-Bip.）。	否	电子邮件
17	鬼针草（金盏银盘）	经查询，现有 14 个外省（市）地方标准收载了鬼针草（或金盏银盘），均未将【含量测定】列入质量标准，且新增【含量测定】会延长检验周期，增加企业成本。建议以异槲皮苷为指标成分的【含量测定】项不列入质量标准。	否	电子邮件

序号	品种名	意见内容	是否采纳	来源
18	红曲	结合《中国药典》一部收载品种【血脂康胶囊】所附的红曲标准及外省（市）地方标准，建议将【检查】项下洛伐他汀限量修改为【含量测定】项，并将限度由“本品按干燥品计算，含洛伐他汀（$C_{24}H_{36}O_5$）不得过 0.20%”修改为“本品按干燥品计算，含洛伐他汀（$C_{24}H_{36}O_5$）不得少于 0.30%”。	否	电子邮件
19	红曲	结合《中国药典》一部收载品种【血脂康胶囊】所附的红曲标准、外省（市）地方标准及现代药理研究和临床应用，建议将【功能与主治】由“健脾消食，活血化瘀。用于饮食积滞，脘腹胀满，赤白下痢，产后恶露不尽，跌扑损伤”修改为“健脾消食，活血化瘀，降脂化浊。用于饮食积滞，脘腹胀满，赤白下痢，产后恶露不尽，跌扑损伤，高脂血症”。	否	电子邮件
20	绿豆	经查询，现有 14 个外省（市）地方标准收载了绿豆，其中 10 个省（市）未将薄层色谱鉴别列入质量标准；同时，绿豆外观性状特征明显，可凭外观性状鉴别真伪，且新增薄层色谱鉴别项会延长检验周期和增加企业成本。建议以牡荆苷对照品和异牡荆苷对照品为对照的薄层色谱鉴别项暂不列入质量标准。	否	电子邮件
21	牛大力	经查询，现有 6 个外省（市）地方标准收载了牛大力，均未将【特征图谱】列入质量标准；同时，牛大力性状特征显著，且新增【特征图谱】项会延长检验周期，增加企业成本。建议【特征图谱】项不列入质量标准。	否	电子邮件
22	肾茶	经查询，现有 7 个外省（市）地方标准收载了	否	电子

序号	品种名	意见内容	是否采纳	来源
		肾茶，均未将【含量测定】列入质量标准；同时，新增【含量测定】项会延长检验周期，增加企业成本。建议以迷迭香酸为指标成分的【含量测定】项不列入质量标准。		邮件
23	天名精	绿原酸为天名精的活性成分之一，为更好控制药材质量，建议新增【含量测定】项，限度拟定为“本品按干燥品计算，含绿原酸（$C_{16}H_{18}O_9$）不得少于 0.10%、含 3,5-*O*-二咖啡酰奎宁酸（$C_{25}H_{24}O_{12}$）不得少于 0.40%”。	否	电子邮件
24	桐叶	毛蕊花糖苷存在于多种药用植物中，专属性不强；同时，新增薄层色谱鉴别项会延长检验周期和增加企业成本。建议以毛蕊花糖苷对照品为对照的薄层色谱鉴别项不列入质量标准。	否	电子邮件
25	乌多年	大黄素属于蒽醌类成分，广泛存在于大黄等多种药材中，专属性不强；同时，新增【含量测定】项会延长检验周期，增加企业成本。建议以大黄素为指标成分的【含量测定】项不列入质量标准。	否	电子邮件
26	五指柑	建议修订含量测定的限度，由“本品按干燥品计算，含异荭草苷（$C_{21}H_{20}O_{11}$）不得少于 0.05%”修改为“本品按干燥品计算，含异荭草苷（$C_{21}H_{20}O_{11}$）不得少于 0.04%”。	否	电子邮件
27	岩陀	建议参考《湖南省中药材标准》（2009 年版），将【性味与归经】中的性味由“苦、涩，平”修改为“苦、涩，凉”。	否	电子邮件
28	岩陀	建议参考《湖南省中药材标准》（2009 年版），将【功能与主治】项中“跌扑损伤”修改为“跌打损伤”。	否	电子邮件

序号	品种名	意见内容	是否采纳	来源
29	玉叶金花	建议修订【浸出物】限度，由“不得少于 11%”修改为“不得少于 9.0%”。	否	电子邮件
30	鱼胆草	基于鱼胆草含有多种结构类型活性成分，且不同产地不同时节差异较大，单一成分难以全面反映药材整体质量。建议【含量测定】项中将仅以“獐牙菜苦苷”作为指标成分的含量测定方法修改为“以獐牙菜苦苷为参照峰，采用一测多评法测定鱼胆草中獐芽菜苦苷、去甲基雏菊叶龙胆呫酮苷、去甲基雏菊叶龙胆酮、龙胆呫酮酚 4 种成分的总量以及獐芽菜苦苷的含量”的方法，限度为“本品按干燥品计算，含獐牙菜苦苷（$C_{16}H_{22}O_{10}$）、去甲基雏菊叶龙胆呫酮苷（$C_{19}H_{18}O_{11}$）、去甲基雏菊叶龙胆酮（$C_{13}H_8O_6$）和龙胆呫酮酚（$C_{14}H_{10}O_6$）的总量不得少于 7.5%，獐牙菜苦苷（$C_{16}H_{22}O_{10}$）不得少于 4.0%”	否	电子邮件
31	竹节伸筋	竹节伸筋非常用中药饮片和制剂投料中药材（或中药饮片），且其常用量为 10～15g，用量较小，不存在长期大量服用；同时，重金属在煎煮液中溶解度低，不易导致过量中毒。建议【检查】项下重金属及有害元素不列入质量标准。	否	电子邮件